

# Cirugía Plástica de Párpados (Blefaroplastía)

By Javier Macció

## PROCEDIMIENTO

El "párpado superior" suele tener piel redundante que se elimina mediante cirugía, con cicatriz mínima.

En el "párpado inferior" es frecuente la aparición de bolsas provocadas por la protusión de la grasa peri orbitaria, con abultamiento por debajo de los ojos, popularmente llamada "bolsas de los ojos".

Para eliminar estas bolsas, se realiza una pequeña incisión por debajo de las pestañas que dejara un cicatriz imperceptible o bien desde el interior del párpado con incisión en la conjuntiva, en este caso lógicamente no resultara ninguna cicatriz externa.

El propósito de esta cirugía es corregir el aspecto envejecido y de cansancio que se produce con el aumento de la flaccidez de la piel y músculos de los párpados, esto también puede llegar incluso a interferir con la visión.

Existen casos, en lo que no esta indicada la resección de piel del párpado inferior, pero si de sus "bolsas grasas". Esta práctica se denomina blefaroplastía.

En manos de un cirujano calificado, es poco probable que un lifting facial presente complicaciones. Pero todo procedimiento quirúrgico, por mínimo que sea, presenta riesgos, y debemos pensar en ellos como una posibilidad.

Son probables, las reacciones adversas a la anestesia, posible lesión de nervios que controlan los músculos de la cara (el nervio facial y/o algunas ramas). Generalmente estas lesiones son temporales pero puede producirse alguna permanente.

Infección, hemorragias, hematoma, cicatrización patológica por exceso o por defecto, asimetría o cambio en la línea de implementación capilar.

## Duración de la Cirugía

Entre 90 minutos y 2 horas si es parcial, y entre 3 y 6 horas si es completa.