

Orejas (Otoplastía)

By Javier Macció

INTRODUCCION

Otoplastía se denomina a la "cirugía de las orejas". Es una técnica quirúrgica que permite modificar los pabellones auriculares que se encuentran alterados, y así obtener un aspecto natural.

La otoplastía puede realizarse a una edad temprana, sin esperar el desarrollo del niño. En orejas demasiado grandes, es posible efectuar una reducción del tamaño de toda la oreja.

Las orejas que están despegadas con respecto a la cabeza ("orejas en asa") pueden ser situadas correctamente.

Los lóbulos de las orejas en las que el agujero de los pendientes se han abierto demasiado o se han desgarrado, pueden ser reparados mediante el cierre total del agujero. En orejas que tienen los lóbulos demasiado grandes en proporción con el resto de la oreja, es posible disminuir el tamaño.

PROCEDIMIENTO

Para aproximar las orejas a la cabeza, la incisión se sitúa detrás de la oreja, por lo que pasa desapercibida.

Existen diferentes técnicas para efectuar la otoplastia, algunas de las cuales se basan en el debilitamiento del cartílago de la oreja, que permite modificar su forma, y otras se basan en la aplicación de unos puntos de sutura para aproximar las estructuras.

El objetivo de ambas técnicas es producir una oreja anatómicamente proporcionada y natural, restaurando o manteniendo los surcos y ángulos normales.

Riesgos y Complicaciones Posibles

En manos de un cirujano calificado, es poco probable que un lifting facial presente complicaciones. Pero todo procedimiento quirúrgico, por mínimo que sea, presenta riesgos, y debemos pensar en ellos como una posibilidad.

Son probables, las reacciones adversas a la anestesia, posible lesión de nervios que controlan los músculos de la cara (el nervio facial y/o algunas ramas). Generalmente estas lesiones son temporales pero puede producirse alguna permanente.

Infección, hemorragias, hematoma, cicatrización patológica por exceso o por defecto, asimetría o cambio en la línea de implementación capilar.

Anestesia

En adultos se efectúa generalmente con anestesia local mas sedición, pero en niños suele efectúan con anestesia local.

Post Operatorio

Después de la intervención es frecuente aplicar un apósito durante unos 3 o 5 días, pasados los cuales se retirara, aunque las orejas puedan presentar aun restos de hinchazón o moretones. También es frecuente la utilización de bandas o cintas de tenista, que mantienen las orejas junto a la cabeza, durante las horas de sueño y al mismo tiempo evitan que el paciente, al dormir, pueda movilizar la zona.